

新型コロナワクチン（XBB対応型） の接種を受けた方へ

ファイザー社
ワクチン

～接種後（特に接種直後～数日間）は体調に注意しましょう～

ワクチンを受けた後 **15分以上** は接種会場で座って様子を見てください。
(過去に重いアレルギー症状(アナフィラキシーを含む)や、採血等で失神や気分が悪くなったことがある方は**30分ほど**お待ちください)

接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

- **ワクチン接種直後から、時には5分以内、通常30分以内**に以下の症状が現れた場合、ショック、アナフィラキシー※の疑いがあります。

※ アナフィラキシーとは、薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。ファイザー社ワクチンでは、今までの国内における接種で**100万回接種あたり9.6件**の頻度でアナフィラキシーが発生していることが分かっています。



皮膚のかゆみ
じんましん
紅斑
皮膚の発赤等



腹痛
吐き気 等



視覚の異常



声のかすれ
咳・くしゃみ
のどのかゆみ
息苦しさ 等



蒼白
意識混濁 等

接種後しばらくの間、会場でお待ちいただき、このような症状がみられた場合には、**ただちに、接種会場の医師や看護師等に申し出てください。**

- **接種会場から帰宅した後、万が一、上記の症状が現れた場合には、県が設置する24時間対応の専門相談窓口等にご相談ください。**

上記の症状が出たら

ぐんまコロナワクチンダイヤル、もしくは接種を受けた医療機関、かかりつけ医へご相談ください。

ぐんまコロナワクチンダイヤル



0570-783-910

通話料が
かかります

24時間 土日祝日も対応

専門的な知識を有する看護師が相談に応じます

接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

このワクチンは筋肉内注射のため、痛みや腫れなどの軽い副反応は頻繁に現れますが、**通常、数日以内**に治ります。必要に応じて解熱鎮痛剤を服用するなど、しばらく様子を見てください。(日常生活に支障をきたす重い症状の割合は、ごくわずかです。)

【接種後、数日以内に現れる可能性のある症状】

発現割合	症状		
	6ヵ月～4歳	5歳～11歳	12歳以上
50%以上	易刺激性※ ¹	疼痛※ ² 、疲労	疼痛※ ² 、頭痛、疲労
5～50%	疼痛※ ² 、発赤・紅斑、腫脹※ ³ 、傾眠※ ⁴ 、頭痛 食欲減退、下痢、嘔吐 筋肉痛、疲労、発熱、悪寒	発赤・紅斑、腫脹※ ³ 頭痛、下痢、筋肉痛 関節痛、悪寒、発熱	腫脹※ ³ 、発赤・紅斑、下痢 筋肉痛、関節痛 リンパ節症※ ⁵ 、悪寒、発熱
1～5%	関節痛	嘔吐	嘔吐

※1 機嫌が悪い

※2 注射部位の痛み

※3 注射部位の腫れ

※4 眠たくなる様子

※5 注射部位と同じ側の脇の腫れや痛み

出典：厚生労働省作成リーフレット

※ 上表中の発現割合は、従来型又はオミクロン株対応型ワクチンを接種したときのデータですが、XBB対応型ワクチンを接種したときもおおむね同様の症状が現れると考えられています。

ワクチン接種後の胸の痛み、動悸、息切れ等について

新型コロナワクチン接種後に、ごくまれに、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。**ワクチン接種後4日程度**の間に**胸の痛み、動悸、息切れ、むくみ**などの症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

上記のような症状が続いたり、手足の力が入りにくい、しびれなどの症状が現れるなど普段と異なる体調の変化があれば、**ぐんまコロナワクチンダイヤル、もしくは接種を受けた医療機関、かかりつけ医**へ相談してください。

予防接種による健康被害についての補償（予防接種健康被害救済制度）

- このワクチンの接種により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済制度(医療費、障害年金等の給付)を受けることができます。
- 申請に必要な手続き等については、住民票がある市町村にご相談ください。審査のうえ、認定された場合に市町村から給付されます。
- 救済制度について詳しく知りたい方は、厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」の「Q 副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。」をご覧ください。



厚生労働省
「新型コロナワクチンQ&A」

群馬県薬務課新型コロナワクチン室