

带状疱疹予防接種について

带状疱疹の発症及び重症化予防、接種費用負担軽減を目的に予防接種費用の一部を助成します。

带状疱疹とは

●原因	水痘・带状疱疹ウイルスの感染による水痘が治癒した後、神経節に潜伏感染しているウイルスが、加齢や疲労、ストレス等がきっかけで再活性化して発症する 皮膚の病気 です。
●症状	体の片側に 水疱を伴う紅斑 が带状に広がり、痛みを伴うことが多く、 症状は3～4週間 ほど続きます。皮膚症状治癒後も、 带状疱疹後神経痛 が長期間に続くことがあります。
●傾向	80歳までに3人に1人 が带状疱疹を経験するとされ、 50歳以上では带状疱疹を発症した人の2割程度 が、带状疱疹後神経痛に移行するとされます

带状疱疹ワクチンについて

現在、带状疱疹ワクチンは2つの製品があります。それぞれに特徴がありますので、下表を参考にご検討ください。

一般名	ビケン	シングリックス
種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種回数／方法	1回／皮下注射	2回／筋肉内注射
带状疱疹発生・带状疱疹後神経痛抑制効果	50～60%	90～95%以上
持続期間	5～8年程度	9年以上
副反応	・注射部位の痛み、腫れ、発赤 ・非常にまれにアナフィラキシーや血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがある	・注射部位の痛み、腫れ、発赤、筋肉痛、全身倦怠感、悪寒、発熱など・非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがある
費用目安(1回)	8,000～10,000円程度	1回20,000～25,000円程度
備考	・免疫不全者は接種出来ない ・接種後、生ワクチンの接種には27日以上を開ける必要あり	〈2回目接種について〉 ・間隔:1回目接種の2～6か月後に受ける ・使用ワクチン:1回目と同じものを受ける